



Terracam Plus
Oxitetraciclina/Piroxicam
Uso Veterinário

ANTIMICROBIANO INJETÁVEL ASSOCIADO A UM ANTI-INFLAMATÓRIO
NÃO-ESTEROIDAL

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 27 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
OVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM OVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
CAPRINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM CAPRINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 29 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Oxitetraciclina base 22,0 g
Piroxicam 1,2 g
Veículo q.s.p 100 mL

Informações técnicas:

Terracam Plus é um produto à base de oxitetraciclina, um antimicrobiano de amplo espectro de ação, associado ao piroxicam, um anti-inflamatório não-esteroidal, analgésico e antipirético. A fórmula apresenta um veículo especial que proporciona ação prolongada, com manutenção de níveis plasmáticos elevados dos princípios ativos por um período de 3 a 5 dias. Devido a essa característica, geralmente uma única aplicação é suficiente para combater os microrganismos sensíveis às tetraciclinas.

Indicações:

Terracam Plus é indicado para o tratamento e controle das infecções causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas, assim como micoplasmas que provocam doenças infecciosas em bovinos, ovinos, caprinos e suínos tais como:

BOVINOS:

Pneumonia e infecções respiratórias (*Pasteurella multocida*, *Haemophilus* spp.); enterites (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp.); actinobacilose (*Actinobacillus* spp.); anaplasmoses (*Anaplasma* spp.); ceratoconjuntivite (*Moraxella bovis*); carbúnculo sintomático (*Clostridium chauvoei*); edema maligno (*Clostridium septicum*); enterotoxemia (*Clostridium perfringens*); listeriose (*Listeria* spp.); nefrites, metrite, abscessos, piodermite, cistites (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium* spp.); brucelose (*Brucella* spp.); mastites (*Enterobacter aerogenes*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium pyogenes*); onfaloflebite (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp.); “foot-rot” (*Fusobacterium necrophorum*) e tétano (*Clostridium tetani*).

SUÍNOS:

Enterites (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp.); pneumonia enzoótica (*Mycoplasma hyopneumoniae*); pleuropneumonia suína (*Haemophilus pleuropneumoniae*); enterotoxemias (*Clostridium* spp.); poliartrite infecciosa (*Haemophilus parasuis*); erisipela (*Erysipelothrix rhusiopathiae*); leptospirose (*Leptospira* spp.); rinite atrofica (*Bordetella bronchiseptica*); síndrome metrite-mastite-agalaxia (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp.); nefrites, metrites, cistites e abscessos (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium pyogenes*).





OVINOS/CAPRINOS

Pneumonia micoplásmica (*Mycoplasma* spp.); enterites (*Shigella* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp.); pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Haemophilus* spp.); actinobacilose (*Actinobacillus* spp.); nefrites, cistites, mastites, abscessos, piodermites (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium pyogenes*, *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp.); carbúnculo sintomático (*Clostridium chauvoei*); edema maligno (*Clostridium septicum*); enterotoxemia (*Clostridium perfringens*) e “foot-rot” (*Fusobacterium necrophorum*).

Dosagem:

1 mL/10 kg peso, ou seja, 20 mg de oxitetraciclina/kg de peso e 1,2 mg de piroxicam/kg de peso.

Via de administração:

Bovinos, suínos, ovinos e caprinos – via intramuscular profunda.

Bovinos, ovinos e caprinos – via subcutânea.

Recomenda-se não injetar num mesmo local doses superiores a 20 mL em bovinos adultos e superiores a 10 mL em bezerras e demais animais.

Período de carência:

- Não administrar a fêmeas leiteiras lactantes quando o leite for destinado ao consumo humano.
- Suspender o tratamento antes do abate, observando-se os seguintes períodos: 27 dias para bovinos, 30 dias para ovinos, 28 dias para caprinos e 29 dias para suínos.

Contraindicações:

- Não administrar a animais com histórico de sensibilidade às tetraciclinas e que tenham alterações hepáticas.
- Não administrar a equídeos, cães e gatos.

Efeitos colaterais e Interação medicamentosa:

- Reações alérgicas e anafiláticas podem ocorrer.
- Fotossensibilidade.
- Formação de quelatos quando o produto for usado em associação com cálcio, ferro, cobalto e alumínio.
- Alterações ósseas.

Apresentação:

Frascos-ampola de vidro âmbar contendo 20 mL, 50 mL e 100 mL.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 9.383 em 10/03/2008.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



SAÚDE ANIMAL

Proprietário e Fabricante:

União Química Farmacêutica Nacional S/A.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90

Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000

DDG: 0800 701 1799

CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira



4007940 • 90 X 150mm • Laetus 309

