

OCTIFEN®
fumarato de cetotifeno

Solução Oftálmica Estérel

GENOM

**MEDICAMENTO SIMILAR
EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO
DE REFERÊNCIA**

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução oftálmica estéril 0,25 mg/mL:
embalagem contendo frasco de 5 mL.

USO OFTÁLMICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS

COMPOSIÇÃO:

Cada mL (39 gotas) contém:
fumarato de cetotifeno.....0,345 mg*
* Equivalente a 0,25 mg de cetotifeno
(0,0064 mg/gota)
Veículo: cloreto de benzalcônio, glicerol,
hidróxido de sódio e água para injetáveis.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

OCTIFEN colírio é indicado para aliviar os
sinais e sintomas da conjuntivite alérgica.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

OCTIFEN colírio contém cetotifeno, que é
um agente antialérgico.
OCTIFEN colírio alivia a reação alérgica
bloqueando os efeitos da histamina,
substância produzida pelo corpo, que causa
vermelhidão, inchaço, coceira e cansaço
dos olhos.
OCTIFEN colírio tem um rápido início de
ação o qual dura de 8 a 12 horas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

OCTIFEN colírio não deve ser usado se
você é alérgico ao cetotifeno ou a qualquer
um dos outros componentes do produto
OCTIFEN colírio.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Tenha cuidado com OCTIFEN colírio se
você usa lentes de contato gelatinosas.
OCTIFEN colírio contém cloreto de
benzalcônio como conservante, que pode
ser absorvido pelas lentes de contato
gelatinosas e descolori-las. Por isso,
OCTIFEN colírio não deve ser aplicado
quando você estiver usando lentes de
contato gelatinosas. As lentes de contato
devem ser retiradas antes da aplicação
de OCTIFEN colírio e não devem ser
recolocadas por pelo menos 15 minutos
após sua aplicação.

Uso em idosos

OCTIFEN colírio pode ser usado por
pacientes acima de 65 anos.



Uso em crianças

OCTIFEN colírio é indicado para uso em
crianças acima de 3 anos de idade.

Gravidez e lactação

Se você está grávida ou está planejando
uma gravidez, pergunte ao seu médico ou
farmacêutico antes de iniciar o tratamento
com OCTIFEN colírio.
OCTIFEN colírio pode ser usado durante
o período de amamentação.
Seu médico irá discutir com você sobre o
risco potencial do uso de OCTIFEN colírio
durante a gravidez.

Categoria C

**Este medicamento não deve ser utilizado
por mulheres grávidas sem orientação
médica ou do cirurgião-dentista.**

Efeitos sobre a habilidade de dirigir veículos e/ ou operar máquinas

Se após o uso do colírio sua visão tornar-se
turva ou você sentir sonolência, espere até
que estes sintomas desapareçam antes de
dirigir ou operar máquinas.

Interações medicamentosas

Avise seu médico se está tomando ou tomou
recentemente qualquer medicamento.
Lembre-se também daqueles não prescritos
pelo médico.
Se você estiver utilizando outras medicações
nos olhos, deve haver um intervalo de pelo
menos 5 minutos entre a utilização de cada
uma.

**Informe seu médico ou cirurgião-
dentista se você estiver fazendo uso de
algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento
do seu médico. Pode ser perigoso para a
sua saúde.**

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o produto em sua embalagem
original e conservar em temperatura
ambiente (entre 15° e 30°C).
O prazo de validade é de 24 meses após a
data de fabricação (vide cartucho).
OCTIFEN colírio permanece estéril até
que o lacre seja rompido. Para evitar
contaminação, não toque o gotejador
em nenhuma superfície. Feche o fras co
imediatamente após o uso.
Após aberto, válido por 30 dias.

**Número de lote e datas de fabricação e
validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de
validade vencido. Guarde-o em sua
embalagem original.**

Aspecto físico: solução límpida e incolor.

**Antes de usar, observe o aspecto do
medicamento. Caso ele esteja no prazo de
validade e você observe alguma mudança
no aspecto, consulte o farmacêutico para
saber se poderá utilizá-lo.**

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A dose é de uma gota no canto interno de cada olho, duas vezes ao dia (pela manhã e à noite).

A dose máxima é de uma gota em cada olho, quatro vezes ao dia.

Como usar

1. Lave suas mãos.
 2. Incline sua cabeça para trás.
 3. Puxe a pálpebra inferior para baixo e segure o frasco invertido sobre os olhos com a outra mão.
 4. Pressione o fundo do frasco com seus dedos para que caia uma gota dentro dos olhos. Sempre evite tocar a ponta do frasco.
 5. Pressione o canto dos olhos com o dedo por 1 - 2 minutos para evitar que a gota escorra pelo ducto lacrimal para a garganta. Desta forma, a maior parte da gota permanece nos olhos para aliviar a doença.
 6. Coloque a tampa no frasco imediatamente após o uso. Para evitar a contaminação, não toque nenhuma superfície com o gotejador.
- Se você sentir que o efeito de OCTIFEN colírio é muito forte ou muito fraco, ou se você apresentar qualquer reação indesejada avise seu médico ou farmacêutico.

A duração do tratamento é conforme indicação médica.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer uma dose, aplique assim que você lembrar e continue normalmente. Tenha certeza que você realmente colocou uma gota no olho.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

OCTIFEN colírio pode causar algumas reações adversas em algumas pessoas.

Alguns efeitos podem ser sérios:

- Se você tem um sangramento visível no branco dos olhos (sintomas da hemorragia subconjuntival - afetam menos que 1 a cada 100 pacientes)
 - Se você tiver lesões localizadas na camada celular externa da córnea (sintomas de erosão epitelial pontuada da córnea - afetam entre 1 e 10 a cada 100 pacientes)
- Se você apresentar qualquer uma destas

reações, avise seu médico imediatamente. Você pode também apresentar algumas das reações adversas a seguir quando estiver usando OCTIFEN colírio.

Comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): queimação ou ardor dos olhos.

Menos comum (ocorre em menos de 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): visão turva temporária imediatamente após aplicação, ressecamento dos olhos, desordem da pálpebra, secreção dos olhos com coceiras, vermelhidão e inchaço (sintomas da conjuntivite), dor nos olhos ou aumento da sensibilidade dos olhos à luz.

Efeitos adversos podem também ocorrer em outras partes do corpo:

Incomum (ocorre em menos de 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor de cabeça, sonolência, eczema, urticária, boca seca e *rash*, coceiras (sintomas de reações alérgicas). Se qualquer um destes efeitos afeta você severamente, avise seu médico.

Se você notar outras reações adversas não relatadas nesta bula, informe seu médico ou farmacêutico.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à

empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Você não deve se preocupar se mais de uma gota cair dentro dos seus olhos.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Registro MS – 1.0497.1358

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP

CEP 06900-000 - CNPJ 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krenças

CRF-SP nº 49136

Fabricado na unidade fabril:

Av. Prof. Olavo Gomes de Oliveira, 4550

Bairro São Cristóvão - Pouso Alegre - MG

CEP 37550-000 - CNPJ 60.665.981/0005-41

Indústria Brasileira

SAC 0800 11 1559

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 30/06/2014.

