



SEC LAC 20
metergolina
USO VETERINÁRIO

ANTIGALACTOGÊNICO PARA CADELAS E GATAS

Fórmula:

Cada comprimido de Sec Lac 20 contém:
Metergolina 2 mg
Excipiente 125 mg

Informações técnicas:

A metergolina inibe a secreção do hormônio prolactina, responsável pela lactogênese, agindo diretamente na correção dos sintomas indesejáveis da lactação, pseudociese e pós-parto. Tais sintomas envolvem aumento de volume mamário, aumento de secreções serosas produzidas pelas glândulas mamárias e alterações de comportamento.

Indicações:

Sec Lac 20 é indicado para cadelas e gatas na interrupção da lactação ou da pseudociese.

Posologia e modo de usar:

O produto deve ser administrado por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado ao alimento. Para cadelas, a dose recomendada é de 0,1 mg/kg de peso (ou seja, 1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal), a cada 12 horas, durante 4 a 8 dias consecutivos. Para gatas, a dose recomendada é de 0,125 mg/kg de peso (ou seja, 1 comprimido para cada 16 kg de peso corporal), a cada 12 horas, durante 4 a 8 dias consecutivos. Com a diminuição acentuada do volume mamário, o tratamento pode ser interrompido ao seu término. Caso haja recidiva, indica-se a repetição do tratamento a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações:

O produto não deve ser administrado a fêmeas gestantes.

Efeitos adversos:

Podem ser observados vômitos no início do tratamento, diarreia moderada e modificação do comportamento (excitação ou agitação). O aparecimento desses efeitos não implica necessariamente na suspensão da terapia. No caso de os animais se tornarem agressivos ou os sintomas permanecerem, a interrupção do tratamento deve ficar a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Strip com 16 comprimidos acondicionados em cartucho.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 7.283 em 04/04/2000.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90

Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000

DDG 0800 701 1799

CNPJ 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

Embalado por:

LABORATIL FARMACÉUTICA LTDA

Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 212 - Cidade Dutra

São Paulo - SP - CEP 04810-050

CNPJ 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



SEC LAC 20
metergolina
USO VETERINÁRIO

ANTIGALACTÓGENO PARA PERRAS Y GATAS

Fórmula:

Cada comprimido de Sec Lac 20 contiene:

Metergolina	2 mg
Excipiente	c.s.p.	125 mg

Informaciones técnicas:

La metergolina inhibe la secreción de la hormona prolactina, responsable de la lactogénesis, actuando directamente en la corrección de los síntomas indeseables de la lactación, pseudogestación y posparto. Tales síntomas incluyen el aumento del volumen mamario, aumento de secreciones serosas producidas por las glándulas mamarias y alteraciones de comportamiento.

Indicaciones:

Sec Lac 20 es indicado para perras y gatas en la interrupción de la lactación o de la pseudogestación.

Posología y modo de uso:

El producto debe ser administrado por vía oral, directamente en la boca del animal o mixturado en el alimento. Para las perras, la dosis recomendada es de 0,1 mg/kg de peso (es decir, 1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal), a cada 12 horas, durante 4 a 8 días consecutivos.

Para las gatas, la dosis recomendada es de 0,125 mg/kg de peso (es decir, 1 comprimido para cada 16 kg de peso corporal), a cada 12 horas, durante 4 a 8 días consecutivos.

Con la disminución acentuada del volumen mamario, el tratamiento puede ser interrumpido al llegar a su término. Caso haya recidiva, se indica la repetición del tratamiento a juicio del Médico Veterinario.

Contraindicaciones:

El producto no debe ser administrado a hembras gestantes.

Efectos adversos:

Pueden observarse vómitos al comienzo del tratamiento, diarrea moderada y modificación del comportamiento (excitación o agitación). La aparición de esos efectos no implica necesariamente la suspensión de la terapia. En el caso que los animales se tornaran agresivos o en que los síntomas permanezcan, la interrupción del tratamiento debe quedar a juicio del Médico Veterinario.

Presentación:

Strip con 16 comprimidos acondicionados en caja.

Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente (15°C a 30°C), al abrigo de la luz solar directa y fuera del alcance de niños y animales domésticos.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN BAJO ORIENTACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO

Licenciado en el Ministerio de Agricultura bajo el nº 7.283 el 04/04/2000.

Responsable Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



Propietario y Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP - Brasil - CEP 06900-000
DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18
® Marca Registrada - Indústria Brasileña

4022121-96 x 150 mm

Embalado por:

LABORATIL FARMACÉUTICA LTDA
Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 212 - Cidade Dutra
São Paulo - SP - CEP 04810-050
CNPJ 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileña

