

# Flamavet<sup>®</sup>

## Meloxicam

**ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE**

**ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL DE USO ORAL PARA CÃES**

### Fórmula:

Cada comprimido de **Flamavet 0,5 mg** contém:

Meloxicam ..... 0,5 mg  
Excipientes .....qsp..... 60 mg

Cada comprimido de **Flamavet 2 mg** contém:

Meloxicam ..... 2 mg  
Excipientes .....qsp..... 240 mg

### Informações técnicas:

**Flamavet** é um anti-inflamatório à base de meloxicam, classificado com anti-inflamatório não esteroideal (AINE), que possui também atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. O **Flamavet** apresenta atividade seletiva para COX-2, proporcionando os efeitos terapêuticos dos anti-inflamatórios não-esteroidais, enquanto a inibição da COX-1 é responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais.

### Indicações:

**Flamavet** é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães.

### Posologia e modo de usar:

O produto deve ser administrado exclusivamente pela via oral.

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo:

Dosagem	Primeiro dia de tratamento	2º dia e tratamentos subsequentes
<b>Flamavet 0,5 mg</b>	2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2mg de meloxicam / kg de peso corporal)	1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1mg de meloxicam / kg de peso corporal)
<b>Flamavet 2 mg</b>	1 comprimido para cada 10 kg de peso corporal (0,2mg de meloxicam / kg de peso corporal)	½ comprimido para cada 10 kg de peso corporal (0,1mg de meloxicam / kg de peso corporal)

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Para tratamento em cães adultos pode ser indicada terapia prolongada por até 35 dias consecutivos e em cães filhotes (a partir de 4 meses) pode ser indicada terapia por até 7 dias consecutivos, ou a critério do Médico Veterinário.

### Contraindicações:

O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao meloxicam ou qualquer um dos componentes da fórmula.

Não administrar o produto aos animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa. Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.

**Não utilizar o produto em animais com idade inferior a 4 meses e fêmeas prenhes ou lactantes.**

### Interações medicamentosas:

Não administrar o **Flamavet** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos.

70 mm

Não utilizar com as medicações: digoxina, fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

**Efeitos adversos:**

Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.

**Intoxicação e Superdosagem:**

No caso de intoxicação e superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

**Precauções:**

Produto de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal.

A maioria dos AINE's são excretados no leite e, portanto, o uso em animais lactantes deve ser cauteloso.

**Apresentação:**

Blister com 10 comprimidos, nas apresentações de 0,5 mg e 2,0 mg.

Display contendo 5 blísteres com 10 comprimidos de 0,5 mg e 2,0 mg.

Conservar em local seco, a temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO  
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
sob o nº SP 000292-5.000030 em 30/03/2021.

Responsável Técnico:  
Vânia N. A. de Carvalho  
CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:  
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90  
Embu-Guaçu - São Paulo - CEP: 06900-000  
DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

4026975 - 150 x 250 mm - Laetus 722



70 mm