



Aliv V[®]
Cloridrato de bromexina
Uso Veterinário

**ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA.
EQUINOS: NÃO UTILIZAR O PRODUTO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de bromexina..... 300,0 mg
Veículoq.s.p..... 100,0 mL

Propriedades:

Trata-se de um expectorante mucolítico assim denominado porque produz diminuição da viscosidade das secreções pulmonares.

A bromexina também altera a permeabilidade da barreira alvéolo-capilar, contribuindo para o aumento das concentrações de imunoglobulinas e certos antibióticos nas secreções pulmonares.

Tais efeitos, aliados à ação broncodilatadora, favorecem a expectoração e a melhora dos quadros de tosse com origem pulmonar.

Indicações: Equinos.

- Coadjuvante no tratamento de bronquites e broncopneumonias agudas e crônicas, de equinos.
- Coadjuvante nos processos pneumônicos virais e verminoses pulmonares
- Nas metrites purulentas de éguas, em associação com antibióticos.

Via e Forma de Administração:

Intravenosa.

Posologia:

Dose Média:

0,15 a 0,3 mg de bromexina/Kg de peso corporal/dia, sendo:

Equinos	25 a 30 mL
----------------	-------------------

Intrauterina:

Dilua 50 mL de produto em 50 mL de água destilada e proceda à infusão intrauterina em éguas.

Duração do Tratamento:

Manter o tratamento até a remissão dos sintomas, variando de 3 a 5 dias.

Contraindicações: EDEMA pulmonar.

Limitação de Uso:

No caso de bronquite verminótica, o produto deve ser administrado apenas 3 dias após o início do tratamento anti-helmíntico.

Precauções:

No caso de infecções primárias e/ou secundárias, fica a critério do Médico Veterinário associar o produto a antimicrobianos ou gamaglobulinas.

Efeitos Colaterais:

A Bromexina pode provocar distúrbios gastrointestinais leves e aumentar o nível de transaminase sérica.

Apresentação:

Frascos-ampola de vidro âmbar, contendo 50 mL.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em 30 dias.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 7.369 em 04/07/2000.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871.



Proprietário e Fabricante:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu - São Paulo - CEP: 06900-095
DDG: 0800 701 1799
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

70 mm

70 mm



4039191 - 90 X 150 mm - PHC 425