

Nutri[®]
maizSM

polivitamínico +
polimineral +
poliaminoácido

Suspensão oral

 União Química

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Suspensão oral: embalagem contendo frasco de 90 mL + copo medida.

USO ORAL

USO PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada 5 mL contém:

| | |
|---|-----------|
| ácido glutâmico | 100,00 mg |
| cloridrato de piridoxina (Vitamina B6) | 2,50 mg |
| cloridrato de tiamina (Vitamina B1) | 5,00 mg |
| cianocobalamina (Vitamina B12) | 15,00 mcg |
| cloridrato de carnitina | 100,00 mg |
| nicotinamida | 20,00 mg |
| fosfato sódico de riboflavina (Vitamina B2) | 1,71 mg* |
| citrato férrico amoniacal | 50,00 mg |
| cloreto de magnésio hexaidratado | 169,00 mg |

*Equivalente a 1,25 mg de riboflavina base

Outros componentes: fosfato de cálcio dibásico di-hidratado

Veículo: propilenoglicol, aroma de *toffe* coco, lauril-

sulfato de sódio, crospovidona, corante de caramelo, sucralose, metilparabeno, dióxido de silício, propilparabeno e sorbitol.

% da IDR* por faixa etária / dose diária recomendada

| | Crianças – Idade (anos) | | |
|--|-------------------------|----------|----------|
| | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 10 |
| cloridrato de piridoxina (vitamina B6) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| cloridrato de tiamina (vitamina B1) | 1.000,00 | 833,33 | 1.111,11 |
| cianocobalamina (vitamina B12) | 1.666,67 | 1.250,00 | 1.666,67 |
| nicotinamida | 333,33 | 250,00 | 333,33 |
| riboflavina (vitamina B2) | 250,00 | 208,33 | 277,78 |
| ferro | 175,62 | 175,62 | 234,16 |
| magnésio | 33,66 | 27,67 | 40,39 |

* Ingestão Diária Recomendada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico e mineral utilizado em dietas restritivas e inadequadas. É um suplemento de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio.



2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico do complexo B em associação com sais de ferro e magnésio, carnitina e ácido glutâmico. As vitaminas do complexo B participam de sistemas enzimáticos (sistemas do corpo que participam de reações químicas), regulando várias fases de metabolismo dos glicídios (moléculas como o açúcar), dos lipídeos (gorduras) e das proteínas. O magnésio é necessário para numerosos sistemas metabólicos e enzimáticos, transferência de fosfatos, contração e relaxamento muscular e condução nervosa. A carnitina é necessária para o metabolismo energético e o ácido glutâmico é importante no metabolismo celular.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gravidez

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação

Este medicamento pode ser administrado durante a lactação sob orientação médica. Informe ao médico se está amamentando.





Pediatria

Este medicamento pode ser administrado em crianças menores de 1 ano somente sob orientação médica.

Interações medicamentosas

Os antiácidos, o sucralfato e os óleos minerais diminuem a absorção das vitaminas.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Os antiácidos diminuem a absorção das vitaminas.

Interferência em exames laboratoriais

Não são conhecidos dados sobre interferência em exames laboratoriais.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C).

O prazo de validade é 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: suspensão viscosa, marrom, aroma de *toffe-coco* / caramelo.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.



Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Agite a suspensão oral antes de usar.

Crianças de 1 a 6 anos

Tomar 2,5 mL duas vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições, ou de acordo com prescrição médica.

Não ultrapassar a dose máxima diária de 10 mL.

Crianças de 7 a 12 anos

Tomar 5 mL duas vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições, ou de acordo com prescrição médica.

Não ultrapassar a dose máxima diária de 15 mL.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer-se de tomar uma dose, tome tão logo você se lembre. Se estiver quase na hora da dose seguinte, pule a dose que você perdeu e volte a tomar no seu horário habitual. Nunca tome 2 doses ao mesmo tempo.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

NUTRIMAIZ SM pode, raramente, provocar náuseas (enjoo), diarreias, vômitos e dor de cabeça.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso

do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Na eventualidade da ingestão acidental ou administração de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

Registro MS – 1.0497.1147

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90

Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-000

CNPJ: 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krenças - CRF-SP: 49136

Fabricado na unidade fabril:

Trecho 01, Conjunto 11, Lote 6/12 - Polo de Desenvolvimento JK
Brasília – DF – CEP: 72.549-555 - CNPJ: 60.665.981/0007-03

Indústria Brasileira - SAC 0800 11 1559

Esta bula foi aprovada pela

Anvisa em 20/03/2015.

