

# Proctfis H<sup>®</sup>

acetato de hidrocortisona 0,5%  
lidocaína base 2,0%  
subgalato de bismuto 2,0%  
óxido de zinco 10,0%

**Pomada para Fissuras de Períneo**

 União Química

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Pomada: cartucho contendo 1 bisnaga de 20g + 10 aplicadores

## USO ADULTO

## USO EXTERNO

## COMPOSIÇÃO:

Cada g contém:

acetato de hidrocortisona .....	5 mg
lidocaína base .....	20 mg
subgalato de bismuto .....	20 mg
óxido de zinco .....	100 mg

Excipientes: propilenoglicol, butilhidroxitolueno e macrogol.

## INDICAÇÕES

Dor e sangramento de hemorroidas internas ou externas, pruridos anais, eczema perianal, proctite branda, fissuras, pró e pós-operatório em cirurgias anorretais (proctológicas).

PROCTFIS H é um medicamento anti-hemorroidal de uso tópico com ação analgésica, anti-inflamatória e antipruriginosa utilizado para o tratamento das hemorroidas, fissuras anais, proctites e eczemas anais. Sua formulação contém o acetato de hidrocortisona que tem ação anti-inflamatória e vasoconstritora quando aplicados diretamente na pele, favorecendo a melhora da circulação sanguínea e diminuindo a secreção da mucosa. A lidocaína é um anestésico com efeito analgésico e antipruriginoso que alivia os sintomas causados pelas hemorroidas, como: dor, coceira, ardor e inflamação. Sua ação é esperada dentro de alguns minutos após a aplicação. O subgalato de bismuto tem efeito anti-inflamatório e antimicrobiano amplamente utilizado para a cicatrização e reparação de feridas. O óxido de zinco tem ação antisséptica e é usado topicamente como relaxante e protetor da pele na aplicação em eczemas, feridas e hemorroidas.

## MODO DE USAR:

Uso externo. Aplicar na área afetada, duas a três vezes ao dia (manhã e a noite). Com a diminuição dos sintomas, uma aplicação ao dia por dois a três dias ou a critério médico.

Espalhe pequena quantidade de pomada na região ao redor do ânus e no orifício anal com o dedo. Usar a ponta do dedo para vencer a resistência do esfíncter do ânus.

Aplicar a pomada utilizando o aplicador, o qual deve ser limpo logo após o uso. O aplicador deve ser adaptado à bisnaga depois de retirada a tampa (a qual deverá ser recolocada após a utilização) e então inserido no ânus. Uma pequena quantidade da pomada deve ser aplicada no reto espremendo a bisnaga suavemente. Nos casos em que a região anal esteja muito inflamada e com lesão dolorosa, é aconselhável iniciar a aplicação da pomada internamente com o dedo.

Recomenda-se o uso de PROCTFIS H após a defecação. A região anal deve ser cuidadosamente limpa antes do uso.



75mm

**ADVERTÊNCIAS:**

- Não utilizar no caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
- Não foram estabelecidas a segurança e eficácia deste produto em crianças, gestantes e mulheres no período da amamentação.
- Evitar permanecer sentado por períodos prolongados e adotar alimentação que evite o ressecamento das fezes.

Mantenha o produto em sua embalagem original em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). O prazo de validade é de 24 meses.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

**PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DESTE MEDICAMENTO, SOLICITE ORIENTAÇÃO DO FARMACÊUTICO.**

**AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

---

N.º do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA  
RDC ANVISA N.º 199/2006  
AFE N.º 1.00.497-7

Registrado por:  
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP  
CEP 06900-000 - CNPJ 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas - CRF-SP n.º 49136

Fabricado por:  
Anovis Industrial Farmacêutica Ltda  
Av. Ibirama, 518 - Bairro Jardim Pirajussara - Taboão da Serra - SP  
CEP: 06785-300 - CNPJ: 19.426.695/0001-04  
Indústria Brasileira

SAC 0800 11 1559

