

Gentamasti L

Vaca Lactante

Uso Veterinário
Aplicação Intramamária

Fórmula:

Cada 10 g contém:

Gentamicina (Sulfato).....250 mg*
Prednisolona.....10 mg
Veículo q.s.p.....10 g
*equivalente a 417 mg de sulfato de gentamicina.

Indicações:

GENTAMASTI L é indicado no tratamento de mastites agudas e crônicas de vacas em lactação, causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos sensíveis à gentamicina: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Corynebacterium bovis*, *Klebsiella pneumoniae*.

Prednisolona - possui ação anti-inflamatória.

Posologia e modo de usar:

Após a ordenha, limpar e desinfetar bem a ponta e canal da teta. Injetar o conteúdo de 1 (uma) seringa em cada quarto afetado, fazer leves massagens de baixo para cima a fim de acelerar o processo de difusão da suspensão.

Dosagem:

A dosagem recomendada é uma seringa de GENTAMASTI L por via intramamária por dia, em cada um dos quartos afetados.

Duração do Tratamento

A duração do tratamento pode variar entre 3 e 5 dias, de acordo com a recomendação do médico veterinário.

"ATENÇÃO - OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA"

BOVINOS

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 17 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções:

- Antes da aplicação intramamária do produto, esgotar o leite, limpar e desinfetar bem o bico da teta e o orifício do canal.
- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Utilizar o produto somente para fins veterinários.
- Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15 °C e 30 °C e, ao abrigo da luz solar direta.
- Em casos de hipersensibilidade à gentamicina ou prednisolona, suspender o tratamento e avisar o médico veterinário.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Apresentação:

Seringa descartável contendo 10g.

Data de vencimento:

02 (dois) anos após a data de fabricação

Licença no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sob nº SP
000105-0.000004

Responsável Técnico: Dr. Paulo Ruegger - CRF-SP
- 11.220

Proprietário e Fabricante.

**SWISSBRAS CHEMICAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS
LTDA.**

Rua José Sierra nr, 211 - Eldorado Centro
Empresarial e Industrial
São José dos Campos-SP - CEP 12.238-571
PABX: (12) 3966-3172 - CNPJ: 06.222.419/0001-74

Distribuído por:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito nr. 90 - Embu - Guaçu
SP - CEP 06900-000
CNPJ 60.665.981/0001-18 - DDG 0800 701 1799