

Mectimax Plus[®] Pasta

Ivermectina
Embonato de Pirantel
Uso Veterinário

ENDOPARASITICIDA PARA EQUINOS

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
EQUINOS: ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO A EQUINOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Ivermectina	0,40 g
Embonato de Pirantel	38,30 g
Excipiente q.s.p	100,0 g
*Contém palatilizante	

Informações técnicas:

Mectimax Plus Pasta[®] é um endoparasiticida composto da associação de ivermectina e pirantel em forma de pasta, indicado para o tratamento de verminoses gastrointestinais em equinos.

A ivermectina é uma lactona macrocíclica da família das avermectinas que induz redução na atividade motora e paralisia em artrópodes e nematódeos. Os efeitos paralíticos são mediados através de canais de cloro regulados por GABA ou glutamato, gerando um aumento lento e irreversível na condutância do cloro pela membrana, hiperpolarização e paralisia flácida nos invertebrados. As avermectinas não atravessam a barreira hematoencefálica, onde estão localizados os canais iônicos mediados pelo GABA nos mamíferos, o que confere a elas uma margem de segurança. As lactonas macrocíclicas não apresentam atividade sobre cestódeos e trematódeos, devido à ausência de sinapses GABAérgicas periféricas ou de receptores com alta afinidade nesses parasitas.

O pirantel é uma tetra-hidropirimidina utilizada no controle de nematódeos gastrointestinais. Atua seletivamente como agonista em receptores colinérgicos nicotínicos em células musculares de nematóides, produzindo contração e paralisia espástica nesses parasitas. Possui propriedades biológicas similares com a acetilcolina, atuando essencialmente ao mimetizar os efeitos paralíticos de quantidades excessivas do neurotransmissor.

Indicações:

Mectimax Plus Pasta[®] é um endoparasiticida indicado para o tratamento de estágios adultos dos seguintes parasitas: *Strongylus vulgaris*, *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Gyaloccephalus capitatus*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, *Trichostrongylus axei*, *Triodontophorus brevicauda*, *Triodontophorus serratus* e *Habronema muscae*.

Posologia e modo de usar:

Mectimax Plus Pasta[®] deve ser administrado via oral, na dose ÚNICA de 200 mcg de ivermectina e 6,6 mg de pirantel por quilograma de peso vivo, ou 5 g do produto por 100 quilogramas de peso vivo, conforme as tabelas:

Espécie	Dosagem	Frequência	Via de administração
Equinos	5 g do produto/100 kg peso vivo	Dose única	Via oral

Peso	Quantidade do produto
Até 100 kg	5,0 g
101 – 200 kg	10,0 g
201 – 300 kg	15,0 g
301 – 400 kg	20,0 g
401 – 500kg	25,0 g

70 mm

70 mm

70 mm

Girar o anel da seringa, deslizando-o pela haste do êmbolo até a marca correspondente ao peso prescrito. Antes da administração, o animal não deve apresentar nenhum alimento na boca. Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal e pressionar o êmbolo até o anel, depositando a quantidade do produto sobre a língua, em direção ao fundo da boca. Após a administração, manter a cabeça do animal levantada por alguns segundos para garantir que a pasta foi consumida.

Contraindicações:

Não utilizar o produto em equinos destinados ao consumo humano.
Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Não utilizar medicamentos após a data de vencimento.
O pirantel não é recomendado para uso em animais severamente debilitados, presumivelmente pois sua ação farmacológica (colinérgica) pode ser mais pronunciada nesses hospedeiros.
Não utilizar o produto em animais com menos de 5 anos de idade, fêmeas prenhes ou lactantes.

Interações Medicamentosas:

Mectimax Plus Pasta® não deve ser administrado simultaneamente com outros fármacos com mecanismos de ação similares, devido ao risco de exacerbação dos efeitos.
O uso de ivermectina concomitantemente com outros medicamentos que podem inibir a glicoproteína-p deve ser feito com precaução.
Os efeitos dos benzodiazepínicos podem ser potencializados pela ivermectina. Não é recomendado o uso de pirantel concomitantemente com outros anti-helmínticos agonistas colinérgicos (como morantel ou levamisole).
Piperazina e pirantel tem mecanismos de ação que se antagonizam e seu uso combinado deve ser evitado.

Efeitos adversos:

O produto, quando utilizado na espécie e nas dosagens indicadas, não provoca reações adversas.

Precauções:

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.
Uso exclusivo em equinos, na posologia e via indicadas.
Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
Usar equipamentos de proteção adequados, tais como luvas, para manuseio e aplicação do produto.
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem do produto.
Manter o produto em sua embalagem original.
Não perfurar a embalagem.
Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.
Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

Superdosagem:

Em estudos clínicos realizados em equinos, não foram observados efeitos adversos após administração do produto em dose 2x maior do que a recomendação de bula.

Apresentação:

Seringa plástica descartável, com êmbolo graduado, contendo 25 g do produto.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura, o conteúdo da seringa deve ser utilizado em até 30 dias.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº SP000292-5. 000041 em 16/12/2002

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.

R. Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90 - Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095

DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada - Indústria Brasileira

403089 - 100 x 150 mm - leatus 1107



70 mm