



Cipiotec

Cipionato de Estradiol

Uso Veterinário

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

HORMÔNIO UTILIZADO PARA SINCRONIZAÇÃO DE OVULAÇÃO EM FÊMEAS BOVINAS.

Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Cipionato de estradiol.....1 mg
Veículo.....q.s.p.....1 mL

Informações técnicas:

Cipiotec (Cipionato de estradiol) é um análogo sintético de estradiol, solúvel em gordura que fornece estradiol-17- β , um potente estrógeno natural. O Cipionato de estradiol induz a sintomatologia de estro rapidamente após a sua aplicação e é um dos principais estrógenos utilizado nas terapias hormonais.

Indicações:

Cipiotec é indicado para induzir e sincronizar a ovulação de fêmeas bovinas em protocolos reprodutivos, pois promove a liberação e pico do hormônio luteinizante (LH).

Posologia e modo de usar:

O produto deve ser administrado exclusivamente pela via intramuscular profunda conforme tabela abaixo:

Produto	Dosagem	Tempo de Tratamento	Via de Administração	Período de carência
Cipiotec	0,5 mL para cada fêmea bovina	Dose única	Via Intramuscular Profunda	Abate e Leite: Não há período de carência



**Precauções:**

Uso exclusivo em animais.

Obedecer o modo de utilização do produto.

Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.

Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações na dosagem do produto.

A resposta à utilização dos hormônios com finalidade de sincronização do cio, depende do estado nutricional em que o animal se encontra e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas. Um correto manejo nutricional na propriedade é imprescindível, uma vez que as características reprodutivas são de baixa herdabilidade e conseqüentemente, são muito mais influenciadas pelo meio.

Evitar o contato do produto com a pele e mucosas.

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

O estradiol é contraindicado durante a gestação, pois pode causar malformações fetais do sistema geniturinário e induzir a depressão da medula óssea fetal.

Efeitos adversos:

Pode ocorrer estro prolongado, irritação genital, desenvolvimento precoce, hiperplasia do endométrio e alterações nos processos metabólicos.

Apresentação:

Frasco na apresentação de 60 mL.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em 30 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº SP 000292-5.000022 em 31/01/2020.

Responsável Técnico:
Vânia Nazaré Alves de Carvalho
CRF-SP 32.871



Proprietário e Fabricante:
União Química Farmacêutica Nacional S/A.
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000
DDG: 0800 701 1799
CNPJ: 06.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

402.1276 - 90 x 150 mm - Laetus 645

