

**Fórmula**

Fluazuron.....	3 g
Fipronil.....	1,25 g
Eprinomectina.....	0,5 g
Veículo q.s.p.....	100,00 mL

**Indicações:**

Combatt 3® é um endectocida indicado para bovinos adultos e bezerros no tratamento das infestações causadas por carrapatos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*), mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e bernes (*Dermatobia hominis*). Também atua no tratamento e na prevenção da instalação de miíases (bicheiras) causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

O Combatt 3® também é indicado no tratamento de infecções causadas pelas formas adultas dos nematódeos gastrointestinais: *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia spatulata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei*.

**Posologia e modo de usar:**

Combatt 3® deve ser administrado exclusivamente pela via tópica (pour on):

Espécie	Dosagem	Via	Tratamento
Bovinos	1,0 mL / 10 kg de peso vivo	Tópico (Pour On)	Dose única

\*Equivale a 3 mg/Kg de Fluazuron, 1,25 mg/Kg de Fipronil e 0,5 mg/Kg de Eprinomectina.

Produto pronto para uso. Aplicar ao longo do dorso do animal, desde a região cervical até a inserção da cauda.

**Contraindicações:**

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Interações medicamentosas:**

Até o momento não foram descritas interações medicamentosas.

**Efeitos adversos:**

Reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático.

**Precauções:**

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter o produto em sua embalagem original.

Não administrar em animais com pele lesionada.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Não perfurar ou reutilizar a embalagem.

Descartar, as embalagens vazias e restos de produto, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente de acordo com a legislação vigente.

Não deixar o produto em contato com rações animais ou alimentos armazenados.

**Cuidados com o manuseio do produto:**

Usar equipamentos de proteção adequados, tais como luvas, óculos de proteção, avental, etc.

**Tratamento de contaminação acidental:**

Grupo químico: Benzilureia (fluazuron), fenilpirazol (fipronil) e avermectina (eprinomectina).

Em caso de intoxicação humana, procurar auxílio médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Não há antídoto específico, o tratamento será sintomático.

**CONSERVAR EM LOCAL SECO, EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 °C A 30 °C), AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em 120 dias.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Apresentação: Frasco plástico contendo 1 litro.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000292-5 000039 em 21/06/2022. A FISPQ deste produto poderá ser obtida junto ao DDG.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

**Proprietário:**

UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90

CEP: 08900-095 - Embu-Guaçu - SP

CNPJ: 00.865.981/0001-18

DDG: 0800 701 1799

**Fabricante:**

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários LTDA.

Rod. Raposo Tavares, Km 113

Barreiro - Arapotiaba da Serra - SP

CEP: 18190-000 - Insc. Est.: 178.005.260.113

CNPJ: 64.687.015/0001-52

Indústria Brasileira



4 031 29 D - 100 x 100 mm