

ANTIBACTERIANO PALATÁVEL PARA CÃES

Fórmula:

Cada comprimido de 321,18 mg contém:

Cefpodoxime*	100 mg
Excipiente (**)	q.s.p. 321,18 mg
*equivalente a 130,45 mg cefpodoxime proxetil	
**Contém palatabilizante.	

Cada comprimido de 642,36 mg contém:

Cefpodoxime*	200 mg
Excipiente (**)	q.s.p. 642,36 mg
*equivalente a 260,90 mg cefpodoxime proxetil	
**Contém palatabilizante.	

Informações técnicas:

Cefpodoxime pertence à terceira geração de cefalosporinas. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da síntese da parede celular bacteriana, portanto é um antibiótico bactericida tempo dependente relativamente resistente às beta lactamases bacterianas. O cefpodoxime é ativado após o éster de proxetil ser clivado *in vivo*.

Indicações:

CEFTRAT é um antibacteriano indicado no tratamento de processos infecciosos em cães causados pelas bactérias: *Fusobacterium nucleatum*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Porphyromonas gulae*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius* e *Streptococcus canis*.

Posologia e modo de usar:

CEFTRAT é um antibacteriano indicado para cães e deve ser administrado exclusivamente pela via oral de acordo com a seguinte tabela:

Espécies	Dose	Intervalo entre doses
Cães	5 – 10 mg de cefpodoxime por kg de peso animal	24 horas

Posologias de até 10mg de cefpodoxime/kg de peso animal, a cada 24 horas durante 10 dias consecutivos, podem ser utilizadas, de acordo com a gravidade do quadro e a remissão dos sintomas, ou a critério do médico veterinário.

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos após a data de vencimento.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.





Interações medicamentosas:

Aminoglicosídeos/drogas nefrotóxicas: O uso concomitante de aminoglicosídeos ou outras drogas nefrotóxicas podem aumentar a nefrotoxicidade.

Antiácidos antagonistas do receptor de H₂ (ex: ranitidina) e inibidores da bomba de prótons (ex: omeprazol): medicamentos que aumentam o pH do estômago podem reduzir a absorção do medicamento.

Probenecida: Bloqueia competitivamente a secreção tubular da maioria das cefalosporinas, aumentando assim os níveis e a meia-vida sérica.

Efeitos adversos:

Podem ser observados os seguintes efeitos adversos: inapetência, diarreia, vômito e letargia.

Raramente são observados reações medicamentosas como hipersensibilidade, pênfigo e discrasias sanguíneas.

Precauções:

Uso exclusivo **em cães** na posologia indicada em bula.

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

Manter o produto em sua embalagem original.

Não utilizar em animais abaixo de 4 meses de idade e fêmeas prenhes/lactantes.

Ocasionalmente o cefpodoxime pode induzir um teste positivo de Coombs direto.

Dosagem e/ou frequência de dosagem devem ser ajustados em pacientes com significativa redução da função renal. O uso em pacientes com desordens convulsivas deve ser feito com cautela.

Superdosagem

Em casos de superdosagem ou ingestão acidental, o uso do carvão ativado associado a outras medidas de urgência podem ser indicados.

Apresentação:

Comprimidos bissulcados de 100mg e 200mg de cefpodoxime acondicionados em:

- Cartuchos contendo 2 strips com 6 comprimidos cada, total de 12 comprimidos.

- Display contendo 10 strips de 6 comprimidos cada, total de 60 comprimidos.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP 000292-5.000020, em 02/12/2019.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - São Paulo - CEP: 06900-095

DDG: 0800 701 1799 / CNPJ: 60.665.981/0001-18

® Marca Registrada – Indústria Brasileira

