

ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL PARA CÃES E GATOS

Fórmula:

Cada 1,0 mL contém:

Meloxicam	2,0 mg
Veículo q.s.p	1,0 mL

Informações técnicas:

Meloxicam é classificado como um anti-inflamatório não esteroideal (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. Os AINEs podem ter sua maior ou menor segurança, de acordo com o grau de seletividade perante as ciclo-oxigenase (COX), enzimas que participam da síntese de prostaglandinas. As COX podem ser classificadas de maneira simplificada como COX-1, que é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e está associada a eventos fisiológicos como a integridade da mucosa gástrica, fluxo sanguíneo renal e na coagulação sanguínea, e COX-2, que é uma enzima de ação induzida relacionada aos eventos da resposta inflamatória. Como o meloxicam apresenta atividade seletiva para COX-2, isto confere uma segurança maior em relação aos efeitos adversos.

Indicações:

Flamavet 0,2% é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães e gatos.

Posologia e modo de usar:

Administrar **Flamavet 0,2%** uma vez ao dia, de acordo com a tabela abaixo:

Espécie	1º dia de tratamento	2º dia e tratamentos subsequentes	Via de Administração
Cães	0,2 mg/kg	0,1 mg/kg	IV ou SC
Gatos	0,1 mg/kg	0,05 mg/kg	SC

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. De acordo com os estudos de segurança realizados, a duração do tratamento poderá ser extrapolada por até 7 dias em cães adultos e até 4 dias em gatos adultos, ou a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não administrar o produto em animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa.

Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.

Não utilizar em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, já que nesses quadros haverá um risco maior de toxicidade renal.

Interações medicamentosas:

Não administrar o **Flamavet 0,2%** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com

as medicações: digoxina, fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

Efeitos adversos:

Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, vômitos, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.

Como outros anti-inflamatórios não esteroidais inibidores de COX-2, meloxicam pode apresentar efeitos na função plaquetária.

Em casos de anafilaxia, interromper o uso do medicamento imediatamente.

Precauções:

- Uso exclusivo em cães e gatos, na posologia indicada em bula.
- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.
- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.
- Manter o produto em sua embalagem original.
- Manter o produto livre de contaminações externas.
- Até o momento, não foram realizados estudos em animais jovens, fêmeas prenhes ou lactantes.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.

Superdosagem:

No caso de superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

Apresentação:

Frasco de vidro incolor de 20 mL

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em até 30 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
sob o nº 30/2018 em 05/02/2018.

Responsável Técnico:
Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000

DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

