



TÍTULO / DESCRIÇÃO SAP
BU ECTOCID SPOT ON

DATA
27/10/2023

IDENTIFICADOR SE-SUITE:
AF 005008

REVISÃO:
04

CÓDIGO SAP:
4035157

CÓDIGO ANTERIOR SAP:
4031648

ELABORADOR DME:
DANIEL SEGALLA

FACA / FORMATO (LX A) - Escala: 1 x 1
150 X 75 MM

PÁGINA:
1 DE 3

ALTERAÇÕES:

- Texto alterado no item INDICAÇÕES para:

O produto é altamente eficaz em até 48 horas após a aplicação. O período médio de ação do ECTOCID® é de 28 dias. O intervalo entre aplicações de ectoparasiticidas é extremamente variável, e dependem de diferentes fatores como questões biológicas ligadas ao parasito (ciclo de vida), nível de desafio parasitário do ambiente onde eles se encontram condições climáticas. O controle completo das pulgas e carrapatos depende do tratamento do animal afetado, dos outros animais de estimação presentes no mesmo ambiente e do ambiente em que o animal vive. A indicação do intervalo de aplicações, portanto, deve ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

BRILLE: N/A

CORES: 1 X 1

ACABAMENTOS:

 **PANTONE**
PROCESS BLACK U

 **FACA**
PRETO

ARTE FINAL



ECTOCID®
CONTRA PULGAS E CARRAPATOS

Fipronil 13%
Uso Veterinário

ECTOPARASITICIDA PARA CÃES

Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Fipronil	130,00 mg
Veículo q.sp	1,00 mL

Informações técnicas:

ECTOCID® é um produto ectoparasiticida à base de fipronil, um agente fenilpirazol que, em invertebrados, inibe de forma não competitiva o ácido gama- aminobutírico (GABA), interferindo na passagem de íons cloreto nos canais regulados pelo GABA. O bloqueio desses canais leva a hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, convulsões e, conseqüentemente, morte do parasito. O fipronil apresenta maior afinidade para receptores gabaérgicos de insetos em comparação aos receptores de mamíferos, o que, juntamente com sua baixa absorção após administração tópica, explica sua ampla margem de segurança. A aplicação tópica de fipronil resulta em distribuição da substância pela superfície da pele por todo o corpo do animal, com significativa deposição nas glândulas sebáceas e folículos

pilosos. As glândulas sebáceas atuam como um reservatório que secreta continuamente o fipronil pelo folículo piloso, formando uma camada no estrato córneo e pelagem do animal, resultando em atividade residual de longa duração.

INDICAÇÕES:

ECTOCID® é indicado no tratamento e controle de infestações causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) em cães.

O produto é altamente eficaz em até 48 horas após a aplicação. O período médio de ação do **ECTOCID®** é de 28 dias.

O intervalo entre aplicações de ectoparasiticidas é extremamente variável, e dependem de diferentes fatores como questões biológicas ligadas ao parasito (ciclo de vida), nível de desafio parasitário do ambiente onde eles se encontram e condições climáticas. O controle completo das pulgas e carrapatos depende do tratamento do animal afetado, dos outros animais de estimação presentes no mesmo ambiente e do ambiente em que o animal vive. A indicação do intervalo de aplicações, portanto, deve ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

O produto não tem ação repelente e age sobre as formas de parasitas que entram em contato com os pelos e pele do animal tratado.

Recomenda-se aguardar 3 dias após a aplicação do produto para banhar os animais tratados.

Os banhos semanais reduzem em 14 dias o período de ação do **ECTOCID®** contra pulgas, enquanto não reduzem o período de ação contra carrapatos.

Posologia e modo de usar:

ECTOCID® deve ser administrado exclusivamente pela via tópica (spot on) em administração única, conforme a tabela abaixo:

Espécie	Faixa de peso	Dosagem	Via de administração
Cães	Até 10 kg	Uma pipeta de 0,67 mL	Tópica (spot on)
	De 10 a 20 kg	Uma pipeta de 1,34 mL	Tópica (spot on)
	De 20 a 40 kg	Uma pipeta de 2,68 mL	Tópica (spot on)
	Acima de 40 kg	Uma pipeta de 4,02 mL	Tópica (spot on)

Quebrar a ponta da pipeta e administrar o produto na região cervical do animal, entre a nuca (base do crânio) e a região do pescoço entre a linha das escápulas, de acordo com o peso do animal. Afastar os pelos na região e aplicar todo o conteúdo da pipeta diretamente sobre a pele do animal.

Podem haver formas imaturas de carrapatos e pulgas já presentes no meio ambiente no momento da aplicação, havendo possibilidade de reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, deve ser realizada uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, utilizando produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

Contraindicações:

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em cães filhotes com menos de 4 meses ou em cadelas lactantes.

Interações medicamentosas:

Até o momento não foram descritas interações medicamentosas.

Efeitos adversos:

Podem ser observadas alterações estéticas como oleosidade dos pelos e aglomeração de pelos no local de aplicação, que se resolvem após algumas horas. Ainda que raramente, o fipronil pode gerar dermatite focal em cães após administração tópica. Ingestão acidental por lambedura do local pode causar hipersalivação, engasgos e êmese.

Precauções:

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

Uso exclusivo em cães, na posologia e via indicadas.

Produto exclusivamente para uso externo.

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Evitar contato com a pele, olhos ou vestimentas. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Usar luvas para sua aplicação.

Manter o produto em sua embalagem original. Não perfurar ou reutilizar a embalagem.

Não contaminar alimentos ou água e fazer o descarte de forma adequada.

Superdosagem

Em estudos clínicos realizados em cães jovens acima de 4 meses de idade, cães adultos e em cadelas gestantes, não foram observados efeitos adversos após a administração do produto em doses até 5x maiores do que a dose recomendada em bula.

Apresentação:

Pipetas plásticas contendo 0,67 mL, 1,34 mL, 2,68 mL e 4,02 mL.

A FISPQ deste produto poderá ser obtida junto ao DDG.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura da pipeta, todo conteúdo do produto deve ser utilizado imediatamente.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

CUIDADO, VENENO!

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob o nº SP 000292-5.000045 em 23/11/2022

Responsável Técnico:
Vânia Nazaré Alves de Carvalho
CRF-SP 32.871

Proprietário:
UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095
DDG: 0800 701 1799
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

Fabricado e embalado por:
**Vetecia Laboratórios de
Produtos Veterinários LTDA,**
Rua Alfredo Ramos, 236, Centro,
Jacareí - SP - CEP 12308-420,
CNPJ: 07.685.131/0001-07
Indústria Brasileira

